



Osmoform®

NXT



NXT – wyższy poziom ogrodnictwa

22

N

5

P₂O₅

11

K₂O

2.0

MgO

TE

Opis

Zapewnij swoim roślinom stałą dawkę azotu i potasu z pomocą Osmoform® NXT. Dzięki nowej technologii granulacji o nazwie SILK (na bazie krzemu) Twoje rośliny będą przez dłuższy czas dostawać potas i czerpać korzyści z wysokiego poziomu tego pierwiastka, a także azotu i fosforu. Zbilansowany skład, który obejmuje azot, gwarantuje nie tylko szybkie działanie, ale też długotrwały efekt, utrzymujący się do 8-10 tygodni.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	22%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	2.9%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	7.6%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	11.5%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	4%

K ₂ O	Tlenek potasu Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	11% 11%
MgO	Tlenek magnezu	2%
Cu	Miedź	0.02%
Fe	Żelazo	0.5%
Mn	Mangan	0.1%
Mo	Molibden	0.001%
Zn	Cynk	0.02%

Korzyści

- 🌱 Produkt przywiera do podłoża
- 🌱 Szybka reakcja roślin i efekt zazielenienia
- 🌱 Łatwy w użyciu

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	1 g/l	2 g/l	3 g/l

Uwaga Stosować maksymalnie 5–6 g na jedno miejsce. W przypadku większych donic/kontenerów podzielić produkt. Nie zostawiać niewykorzystanego produktu w dozownikach. Konieczne jest dostosowanie dawek do

konkretnego składu podłoża (kory), gatunku roślin i systemu uprawy. Aby uzyskać pełne nawożenie roślin o długim cyklu produkcji, zalecamy dodatkowe zastosowanie Osmocote® Exact lub nawozu rozpuszczalnego w wodzie. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 Osmoform® NXT nadaje się do stosowania powierzchniowego w uprawach kontenerowych lub w sytuacji, gdy potrzebne jest długotrwałe działanie azotu i potasu.
- 2 Azot i potas są uwalniane przez około 8–10 tygodni od aplikacji.
- 3 Przy aplikacji powierzchniowej ważne jest, aby nawóz został równomiernie rozprowadzony na powierzchni podłoża. W razie stosowania posypowego wokół roślin należy usunąć granulki z liści.
- 4 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 5 Przechowywać w suchym miejscu.
- 6 W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z obsługą techniczną.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmoform-nxt/>

Ostatnia aktualizacja: 12/08/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

