



LALGUARD M52^{GR}

Lalguard M52

\\ Lalguard M52 GR to skuteczny bioinsektycyd do zwalczania opuchlaka truskawkowca. Nie wymaga stosowania innych środków! Wysoka skuteczność, porównywalna z wieloma środkami chemicznymi. Łatwy w aplikacji, działa w podłożu przez wiele miesięcy od zastosowania.

Opis

Lalguard M52 to nowoczesny, biologiczny preparat owadobójczy, który jest odpowiedzią na potrzeby producentów roślin ozdobnych, pod osłonami i w uprawach polowych. Lalguard M52 jest dostępny w postaci granulatu w opakowaniach 1 kg i 10 kg. Preparat jest opracowany na bazie grzyba *Metarhizium brunneum* i przeznaczony do stosowania w podłożach do uprawy roślin ozdobnych i owoców miękkich. Charakteryzuje się wysoką skutecznością, porównywalną ze środkami chemicznymi. Bezpieczny dla pożytecznych organizmów glebowych. Łatwy w aplikacji, działa w podłożu przez wiele miesięcy od zastosowania.

Korzyści

- \\ Skutecznie zwalcza opuchlaka truskawkowca i inne gatunki z rodzaju *Otiorhynchus*.
- \\ Skuteczny bioinsektycyd nie wymagający stosowania innych środków w walce z opuchlakiem truskawkowcem.
- \\ Wysoka skuteczność, porównywalna z wieloma środkami chemicznymi.
- \\ Łatwy w aplikacji, działa w podłożu przez wiele miesięcy od zastosowania.
- \\ Kompatybilny z konwencjonalnymi i organicznymi programami IPM.
- \\ Bezpieczny dla pożytecznych makroorganizmów, uzupełnia działanie nicieni entomopatogenicznych (EPN).
- \\ Wypełnia na rynku istniejącą lukę dostępnych środków do walki z opuchlakiem truskawkowcem.
- \\ Brak okresu prewencji w uprawach roślin ozdobnych.

Brak pozostałości / nie podlega MRL (Maximum Residue Limit – najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości).

Może być stosowany na każdym etapie procesu produkcyjnego roślin.

Dawki

Uprawy	Rodzaj produkcji	Metoda aplikacji	Termin stosowania	Dawkowanie	Okres karencji
Uprawy szkółkarskie, byliny	W pojemnikach	Wymieszać z podłożem przed doniczkowaniem	Wszystkie fazy rozwojowe, styczeń–grudzień (optymalna temp. 15-30°C)	*0,5kg/m ³ (**150-300kg/ha)	Brak
Uprawy szkółkarskie, byliny	W gruncie	Wymieszać z wierzchnią warstwą gleby	Wszystkie fazy rozwojowe, styczeń–grudzień (optymalna temp. 15-30°C)	12,5-25kg/ha	Brak
Kwiaty i rośliny ozdobne	W pojemnikach pod osłonami	Wymieszać z podłożem przed sadzeniem	Wszystkie fazy rozwojowe, styczeń–grudzień (optymalna temp. 15-30°C)	*0,5kg/m ³ (**150-300kg/ha)	Brak
Kwiaty i rośliny ozdobne	W gruncie	Wymieszać z wierzchnią warstwą gleby	Wszystkie fazy rozwojowe, styczeń–grudzień (optymalna temp. 15-30°C)	12,5-25kg/ha	Brak
Owoce miękkie: truskawki, maliny, jeżyny, agrest, porzeczki, jagody	W pojemnikach	Wymieszać z podłożem przed doniczkowaniem	Wszystkie fazy rozwojowe, styczeń–grudzień (optymalna temp. 15-30°C)	*0,5kg/m ³ (**150-300kg/ha)	Nie stosować w dniu zbioru owoców
Owoce miękkie: truskawki, maliny, jeżyny, agrest, porzeczki, jagody	W gruncie	Wymieszać z wierzchnią warstwą gleby	Wszystkie fazy rozwojowe, styczeń–grudzień (optymalna temp. 15-30°C)	12,5-25kg/ha	Nie stosować w dniu zbioru owoców

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych produktów. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zawsze skontaktować się z doradcą ICL.

Sposób stosowania

- Preparat dokładnie wymieszaj z podłożem przed sadzeniem. Zalecamy wymieszać najpierw z 1/3 podłoża, a następnie z resztą. Preparat może zostać również aplikowany przez producenta podłoża. Skontaktuj się z regionalnym doradcą techniczno-handlowym ICL w celu ustalenia rozwiązania najlepiej dopasowanego do Twoich upraw.
- Substraty uprawowe nie powinny być suche ani zbyt mokre (zwłaszcza te na bazie kory, aby nie dopuścić do przegrzania).
- Wykorzystaj zmieszane z preparatem podłoże w ciągu 30 dni.
- Optymalna temperatura wynosi 15–30°C (zarodniki przeżywają, jeśli ulegną zamarznięciu).
- Dane na temat skuteczności w cięższych typach gleb są ograniczone.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/lalguard-m52/>

Ostatnia aktualizacja: 02/06/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

