



Osmocote® 5

5 5-6M

Πέντεgwiazdkowy wzrost w ciągu pięciu miesięcy

16 | 8 | 12 | 2.2 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Opis

Przejmij pełną kontrolę nad swoim późnowiosennym sadzeniem z pomocą technologii kontrolowanego uwalniania składników Osmocote® Pro 5-6M. Piąta generacja nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników zapewnia roślinom stałe, bezpieczne i skuteczne odżywianie przez 5 do 6 miesięcy. Uzyskaj maksymalnie zdrowe i dorodne rośliny o nasyconych barwach, optymalizując dostępność i pobór mikroelementów dzięki systemowi OTEA.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	16%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	7.2%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.8%

P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	8%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6%
K ₂ O	Tlenek potasu	12%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	12%
MgO	Tlenek magnezu	2.2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	0.6%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.015%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.015%
	Miedź EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Żelazo	0.3%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.3%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.3%
Mn	Mangan	0.05%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.05%
	Mangan EDTA (Mn)	0.05%
Mo	Molibden	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.01%
Zn	Cynk	0.012%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.012%
	Cynk EDTA (Zn)	0.012%

Korzyści

- \\ Zapewnia lepsze, bardziej precyzyjne odżywianie dzięki technologii NutriMatch-Release
- \\ Oferuje największą skuteczność uwalniania składników odżywczych
- \\ Gwarantowana jakość produktu, każdy worek jest identyczny

Dawki

	Przeciętne wymagania pokarmowe	Duże wymagania pokarmowe	Minimalna zalecana dawka podstawowa (w przypadku stosowania dodatkowych nawozów rozpuszczalnych w wodzie)
Uprawy szkółkarskie i byliny (pod osłonami)	2-2.5 g/l	3-4 g/l	2 g/l
Uprawy szkółkarskie i byliny (pod osłonami)	3-3.5 g/l	4-5 g/l	2-3 g/l
Rośliny doniczkowe	3-4 g/l	4-5.5 g/l	2-3 g/l
Rośliny rabatowe/balkonowe	3-4 g/l	4-5.5 g/l	2-3 g/l

Ważne: Maksymalna zalecana dawka nawozu startowego w podłożu wynosi 0,5 kg/m³. Dawki Osmocote® 5 są dostosowane do pojemności doniczek. W przypadku przesadzania do większych doniczek, należy skompensować efekt rozcieńczenia nawozu, zwiększając dawkę w nowym podłożu. Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne. Ten produkt nie jest polecany do nawożenia punktowego wgłębnego i/lub sadzenia jesienią i zimą. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bardziej szczegółowe porady.

Sposób stosowania

- 1 Stosuj Osmocote® 5 5-6M do upraw kontenerowych o krótkim cyklu produkcyjnym, roślin wieloletnich oraz różnego rodzaju roślin doniczkowych.
- 2 Wymieszaj produkt z podłożem, aby zapewnić optymalne rozmieszczenie granulek.
- 3 Możesz stosować Osmocote® 5 punktowo włąębnie. Aby uzyskać dodatkowe porady, skontaktuj się z doradcą technicznym ICL.
- 4 Skontaktuj się z nami, jeśli został zastosowany produkt Micromax Premium w dawce przekraczającej 200 g/m³ podłoża i połączony z nawozem Osmocote® 5.
- 5 Możesz łączyć Osmocote® 5 z nawozami rozpuszczalnymi w wodzie Peters i Universol®.
- 6 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® 5 5-6M. (Nawóz działa przez czas określony przez producenta przy temperaturze 21°C). 16°C: 5–7 mies. 21°C: 5–6 mies. 26°C: 4–5 mies.
- 7 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 8 Przechowywać w suchym miejscu.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmocote-5-5-5-6m/>

Ostatnia aktualizacja: 03/07/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

