



# Osmocote<sup>®</sup> 5

## | 8-9M

Wczesna wiosna, wczesny wzrost

16 | 8 | 12 | 2.2 | TE  
N P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> K<sub>2</sub>O MgO



## Opis

Zadbaj o potrzeby wszystkich swoich wczesnowiosennych nasadzeń z 5 generacją nawozu Osmocote 5 o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych. Zagwarantuj stałe, bezpieczne i skuteczne odżywianie swoich roślin przez 8 do 9 miesięcy. Zoptymalizuj dostępność i pobór mikroelementów dzięki systemowi OTEA, który zapewni Twoim roślinom najlepsze wybarwienie, wzrost i zdrowie.

## Gwarantowana analiza

### Tlenek

|                               |                                       |      |
|-------------------------------|---------------------------------------|------|
| N                             | Azot całkowity                        | 16%  |
|                               | Azot azotanowy (N-NO <sub>3</sub> )   | 7.2% |
|                               | Azot amoniakalny (N-NH <sub>4</sub> ) | 8.8% |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Pięciotlenek fosforu                  | 8%   |

|                  |                                                         |               |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
|                  | Rozpuszczalny w wodzie (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 6%            |
| K <sub>2</sub> O | Tlenek potasu                                           | <b>12%</b>    |
|                  | Rozpuszczalny w wodzie (K <sub>2</sub> O)               | 12%           |
| MgO              | Tlenek magnezu                                          | <b>2.2%</b>   |
|                  | Rozpuszczalny w wodzie (MgO)                            | 0.6%          |
| B                | Bor                                                     | <b>0.01%</b>  |
|                  | Rozpuszczalny w wodzie (B)                              | 0.01%         |
| Cu               | Miedź                                                   | <b>0.015%</b> |
|                  | Rozpuszczalny w wodzie (Cu)                             | 0.015%        |
|                  | Miedź EDTA (Cu)                                         | 0.015%        |
| Fe               | Żelazo                                                  | <b>0.3%</b>   |
|                  | Rozpuszczalny w wodzie (Fe)                             | 0.3%          |
|                  | Żelazo EDTA (Fe)                                        | 0.3%          |
| Mn               | Mangan                                                  | <b>0.05%</b>  |
|                  | Rozpuszczalny w wodzie (Mn)                             | 0.05%         |
|                  | Mangan EDTA (Mn)                                        | 0.05%         |
| Mo               | Molibden                                                | <b>0.01%</b>  |
|                  | Rozpuszczalny w wodzie (Mo)                             | 0.01%         |
| Zn               | Cynk                                                    | <b>0.012%</b> |
|                  | Rozpuszczalny w wodzie (Zn)                             | 0.012%        |
|                  | Cynk EDTA (Zn)                                          | 0.012%        |

## Korzyści

Technologia NutriMatch-Release zapewnia lepsze i bardziej precyzyjne odżywianie

Gwarantowana jakość produktu, każdy worek jest identyczny

## Dawki

|                                                 | Przeciętne wymagania pokarmowe | Duże wymagania pokarmowe | Minimalna zalecana dawka podstawowa (w przypadku stosowania dodatkowych nawozów rozpuszczalnych w wodzie) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uprawy szkółkarskie i byliny (pod osłonami)     | 3.5-4.5 g/l                    | 4-4.5 g/l                | 2-3 g/l                                                                                                   |
| Uprawy szkółkarskie i byliny (pod gołym niebem) | 4.5-5.5 g/l                    | 5.5-6.5 g/l              | 3-4 g/l                                                                                                   |
| Rośliny doniczkowe                              | 4.5-5.5 g/l                    | 5.5-6.5 g/l              | 3-4 g/l                                                                                                   |

Ważne: Maksymalna zalecana dawka nawozu startowego w podłożu wynosi 0,5 kg/m<sup>3</sup>. Dawki Osmocote® 5 są dostosowane do pojemności doniczek. W przypadku przesadzania do większych doniczek, należy skompensować efekt rozcieńczenia nawozu, zwiększając dawkę w nowym podłożu. Aby uzyskać zalecenia dotyczące konkretnych roślin, należy skonsultować się z doradcą ICL. Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne. Ten produkt nie jest polecany do nawożenia punktowego wgłębnego i/lub sadzenia jesienią i zimą. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

## Sposób stosowania

- 1 Stosuj Osmocote® 5 8-9M przede wszystkim do upraw kontenerowych, roślin wieloletnich oraz różnego rodzaju doniczkowych upraw o krótkim cyklu produkcyjnym.
- 2 Wymieszaj produkt bezpośrednio z podłożem, aby zapewnić optymalne rozmieszczenie granulek.
- 3 Możesz stosować Osmocote® 5 punktowo wgłębnie. Aby uzyskać dodatkowe porady, skontaktuj się z doradcą technicznym ICL.

- 4 W razie zastosowania produktu Micromax Premium w dawce przekraczającej 200 g/m<sup>3</sup> podłoża i połączenia z nawozem Osmocote® 5, skontaktuj się z doradcą technicznym ICL, aby uzyskać szczegółowe zalecenia.
- 5 Możesz łączyć Osmocote® 5 z nawozami rozpuszczalnymi w wodzie Peters i Universol®. Aby uzyskać szczegółowe zalecenia, skontaktuj się z doradcą technicznym ICL.
- 6 Temperatura może wpływać na czas działania Osmocote® 5 8-9M. (Nawóz działa przez czas określony przez producenta przy temperaturze 21°C). 16°C: 10–11 mies. 21°C: 8–9 mies. 26°C: 6–7 mies.
- 7 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 8 Przechowywać w suchym miejscu.

## Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmocote-5-8-9m/>

Ostatnia aktualizacja: 03/07/2024

ICL Growing Solutions [marketing.int@icl-group.com](mailto:marketing.int@icl-group.com)

