



Osmocote® Topdress

Topdress FT 4-5M

Topowe rozwiązanie do wszelkich zastosowań powierzchniowych

22 | 5 | 6 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Opis

Otoczkowany nawóz Osmocote Topdress FT 4-5M jest opracowany do powierzchniowego nawożenia kontenerowych upraw szkółkarskich. Sprawdza się szczególnie w kolejnych latach uprawy, gdy nie przesadzamy roślin, a podłoże jest przerośnięte korzeniami co utrudnia aplikację wgłębną. Wykorzystuje specjalną technologię łączenia (Fusion Technology), która umożliwia mu dobre przywarcie do podłoża. Pod wpływem wilgoci granulki przyklejają się do powierzchni, co ogranicza wysypywanie się nawozu w transporcie lub gdy roślina przewróci się na zagonie. Osmocote Topdress dostarcza wszystkie niezbędne makro- i mikroelementy.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	22%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	4.8%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	5.9%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	11.3%

P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	3.7%
K ₂ O	Tlenek potasu	6%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	6%
MgO	Tlenek magnezu	2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1%
Cu	Miedź	0.05%
Fe	Żelazo	0.8%
Mn	Mangan	0.3%
Zn	Cynk	0.1%

Korzyści

- ▶ Produkt zawiera duże ilości regularnie uwalnianych pierwiastków azotu i fosforu
- ▶ Dzięki niewielkim rozmiarom granulek możliwe jest ich równomierne rozmieszczenie
- ▶ Dodatkowe mikroelementy gwarantują optymalny efekt zazielenienia

Dawki

	Pojemniki < 10 litrów	Pojemniki > 10 litrów
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	2–4 g/l	na każdy dodatkowy litr pojemności*

* Przykład: Całkowita dawka na 50-litrowy pojemnik: 3 g/l na pierwszych 10 litrów = 30 gramów 1 g/l na dodatkowe 40 litrów = 40 gramów Suma = 30 + 40 = 70 gramów na 50-litrowy pojemnik Przed zmianą dawki,

sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 W przypadku roślin wrażliwych należy zmniejszyć zalecane dawki.
- 2 Produkt wyłącznie do aplikacji powierzchniowej. W razie stosowania podlewania kropelkowego umieść produkt pod kroplownikami.
- 3 Produkt nie jest przeznaczony do mieszania z podłożem lub stosowania punktowego wgłębnego.
- 4 Produkty do aplikacji powierzchniowej nie mogą być stosowane na matach podsiąkowych lub w systemach zalewowych.
- 5 Przechowywać w suchym miejscu.
- 6 Częściowo zużyte lub uszkodzone opakowania szczelnie zamknąć.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmocote-topdress-topdress-ft-4-5m/>

Ostatnia aktualizacja: 02/06/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

